

Vocabulaire

Formation théorique du permis de chasser



Termes	définitions
A - B	
Abroustissement	Le chevreuil est capable de consommer les jeunes pousses de certains arbres. Ce comportement se nomme l'abroustissement.
Bas-vol	La chasse de bas vol permet aussi bien de capturer des oiseaux (faisans, canards, etc.) que des mammifères (lapins, etc.). On utilise généralement des buses de Haris.
Bauge	Pour se reposer le jour, le sanglier gratte le sol, y pratiquant une cavité dans laquelle il se couche, c'est une bauge.
Bois	Production osseuse du haut de la tête des mâles de cerf et de chevreuil. Les bois tombent tous les ans, on dit qu'ils sont caducs.
Bouquinage	Dans l'espèce lièvre, le mâle est appelé bouquin. On dénomme bouquinage les poursuites et combats qui préludent aux accouplements du lièvre.
Boutis	Le sanglier, à la recherche des lombrics, de mulots ou même de racines, creuse le sol de son boutoir. Les cavités ainsi réalisées sont des boutis
Boutons	A la fin de sa première année, on distingue sur la tête du chevillard mâle deux protubérances appelées boutons.
Brâme	Chez le cerf, le rut appelé brâme, a lieu en septembre - octobre
Brocard	Le mâle, chez le chevreuil est appelé brocard
C - D	
Chaudron	Pour mettre bas, la laie s'isole et construit une sorte de nid, constitué d'un amas de végétaux. Il s'agit du chaudron.
Chevrette	La femelle du chevreuil est appelée chevrette
Chocke	C'est le rétrécissement de la bouche des canons permettant d'obtenir une gerbe de plombs plus ou moins fermée.
Coulée	Les animaux, parfois d'espèces différentes, empruntent régulièrement les mêmes passages dans la végétation. La trace qu'ils y laissent s'appelle une coulée.
Croûle	On appelle croûle le chant caractéristique des bécasses émis pendant le vol de parade nuptial. La chasse à la croûle est interdite.
Daguet	Pendant sa deuxième année, le jeune cerf porte des dagues, et se nomme donc daguet. On peut rencontrer des daguet fourchus.
Défense	Les canines de la mâchoire inférieure du sanglier mâle sont extrêmement tranchantes et constituent des armes redoutables : les défenses.
Drilling	On appelle drilling un fusil comportant un canon rayé et deux canons lisses. Le plus souvent, le canon rayé est situé sous les canons lisses juxtaposés.
E - F - G - H	
Écorçage	Le cerf peut écorcer certains arbres en les endommageant parfois gravement. Ce comportement se nomme l'écorçage.

Vocabulaire

Formation théorique du permis de chasser

Express	Un express comporte deux canons rayés, juxtaposés ou superposés. C'est une arme particulièrement adaptée au tir du grand gibier en battue.
Frottis	A différentes périodes de l'année, le chevreuil se frotte les bois sur de jeunes pousses d'arbres pour les débarrasser des velours ou pour marquer son territoire : ce sont des frottis
Grès	Les canines de la mâchoire supérieure du sanglier sont appelées grès. Elles servent à l'affûtage permanent des défenses.
Haut-vol	La chasse de haut vol utilise essentiellement les faucons, et en particulier le faucon pèlerin.
Hère	A 6 mois, le faon de cerf perd les taches blanches de son pelage et prend, jusqu'à l'âge d'un an, l'appellation de hère.
I à Z	
Marcassin	Jusqu'à 6 mois, le sanglier présente une livrée jaune marquée de rayures plus sombres. Il est alors dénommé marcassin.
Merrains	Les bois du cerf sont constitués par les merrains, sur lesquels prennent place les andouillers
Miroir	Le miroir est une tâche colorée située sur les ailes des canards de surface. Il permet de les distinguer au premier coup d'œil des canards plongeurs.
Mixte	On appelle fusil mixte une arme comportant un canon rayé et un canon lisse
Mulet	Chaque année, le cerf perd ses bois, il est alors appelé cerf mulet.
Naturaliser	C'est la méthode qui permet de conserver les animaux et de les présenter dans des poses diverses.
Nidicole	on utilise ce terme pour qualifier les jeunes d'une espèce qui restent dans le nid pendant une certaine période après la naissance (ex. le pigeon)
Nidifuge	On utilise ce terme pour qualifier les jeunes d'une espèce qui quittent le nid juste après la naissance (ex. le canard)
Rabouillère	La rabouillère est un petit terrier à entrée unique de 50 à 80 cm de long, il sert à la lapine pour mettre bas.
Ravaler	La ramure d'un cerf atteint son apogée entre 8 et 12 ans. Ensuite la taille des bois peut diminuer. On dit que le cerf ravale.
Régalis	Pour bien marquer leur territoire, les brocards grattent le sol avec leurs pattes avants, laissant ainsi des régalis bien visibles.
Souille	Pour limiter les démangeaisons et lutter contre la chaleur, le sanglier, quasi-journellement, se vautre dans une cuvette boueuse appelée "souille"
Stecher	Le stecher est un mécanisme qui permet de rendre le départ du coup extrêmement sensible lorsque l'on touche la queue de détente. Il évite au chasseur le "coup de doigt" mais ne peut s'utiliser qu'à l'approche ou à l'affût.
Velours	Lorsque les bois du cerf ou du chevreuil repoussent, ils sont entourés d'une peau soyeuse appelée velours dont ils se débarrasseront en frayant les bois contre les arbres.
Vermillis	Les feuilles superficielles du sanglier sont appelées des vermillis